

Esses recursos não são utilizados de rotina e são indicados apenas quando há necessidade médica para garantir a segurança da mãe e do bebê.

CHEGADA DO BEBÊ



O clampeamento tardio de cordão umbilical deve ser feito entre 1 e 3 minutos após o nascimento para reduzir a chance de anemia no primeiro ano de vida. Essa conduta sempre é respeitada, a não ser que o bebê precise de algum atendimento imediato.

A primeira hora de vida do bebê é muito importante para fortalecer o vínculo entre mãe e filho, reduzir riscos ao recém-nascido e favorecer o início da amamentação.

Quando o bebê nasce com mais de 34 semanas e boas condições de vitalidade, procuramos mantê-lo em contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento, tanto no parto vaginal quanto na cesariana.

Nesse momento, pode-se oferecer o seio materno ao bebê. Ele pode ou não mamar imediatamente, mas esse contato ajuda a estimular a produção de leite e a iniciar a amamentação.

São rotinas recomendadas pela OMS e Sociedade de Pediatria :

- Banho tardio do recém-nascido;
- Aplicar um produto antimicrobiano no olho do bebê em todos os nascimentos de parto normal e nas cesáreas com bolsa rota para reduzir a chance de oftálmica neonatal e ocorrência de cegueira;
- Para evitar a ocorrência de doença hemorrágica em recém nascido é recomendado administrar Vit K intramuscular em todos os bebês

